

CONSEILS POST-OPÉRATOIRES

GREFFE OSSEUSE

Document d'information à destination des patients

Les 48 premières heures

- Ne pas toucher la zone opérée
- Éviter traction de la joue
- Appliquer de la Glace pendant 24-48h
- Un gonflement est possible

Médicaments

- Respecter strictement l'ordonnance
- Pas d'AINS non prescrits
- Limiter le port de la prothèse de 0-14J, la prothèse sera modifiée pour éviter une pression sur la zone opérée

Saignements

- Un léger saignement est normal les premières 24 heures
- Mordre sur une compresse pendant au moins 15 à 20 minutes pour stopper le saignement
- Consulter si le saignement est persistant

Hygiène

- Effectuer un brossage normal hors zone opératoire
- Pas de brossage sur la zone opérée de 0- 7 jours
- Utilisation d'un bain de bouche à la chlorhexidine à partir de 24h sans rincer puis reprise d'un brossage doux avec brosse chirurgicale à partir de J+7

Alimentation

- Molle et tiède
- Pas de mastication côté opéré

Tabac – Alcool

- Tabac déconseillé au moins pendant les 7 premiers jours
- Pas d'alcool

Sutures

- Résorbables, retrait si gêne au rendez-vous de contrôle

Contactez le cabinet en cas de :

- Douleur importante et croissante
- Fièvre